



## Totalherbizid Konzentrat Forte / Herbicide total concentré Forte / Erbicida totale concentrato Forte

### Gebrauchsanweisung:

Capito Totalherbizid Konzentrat Forte bekämpft Unkräuter und Gräser.

Das Produkt ist ein **Totalherbizid auf Kontaktbasis**. Ideal ist die Anwendung auf junge Unkräuter und Gräser mit einer Höhe von unter 10 cm im Frühjahr.

Der beste Bekämpfungserfolg wird bei sonnigem, warmem Wetter sowie auf trockene Pflanzen erzielt. Nach der Behandlung sollte während 6–8 Stunden kein Regen fallen. Mehrjährige Unkräuter und Ungräser können nach gewisser Zeit wieder austreiben, ggf. ist die Behandlung nach 5–10 Tagen zu wiederholen.

**Anwendungsgebiete:** Unter Kernobst, Steinobst, Bäumen und Sträucher (ausserhalb Forst), Blumenkulturen und Grünpflanzen, Rosen, Brachen vor der Neuansaat/Bepflanzung von Zierpflanzen oder Gemüsekulturen.

### Anwendung/Aufwandmenge:

**Gegen Unkräuter und Gräser** mit der Rückenspritze:

Dosierung: 20 ml vom Produkt pro 3 dl Wasser (6%) reichen für 10 m<sup>2</sup> behandelte Fläche. Die Reichweite der Packung beträgt 125 m<sup>2</sup>. Verholzte Pflanzenteile werden nicht beschädigt.

**Auflagen:** Maximal 2 Behandlungen pro Jahr. Im Spritztank bei laufendem Rührwerk anwenden. Bei Spritzgeräten ohne Rührwerk Brühe regelmässig schütteln/rühren. Bei der Anwendung des Mittels Schutzbrille tragen. Anwendung auf die trockenen Unkräuter und Ungräser. In Brachen: Behandlung bis spätestens 7 Tage vor der Saat oder Pflanzung. **Vorsicht: Grüne bzw. unverholzte Pflanzenteile der Kulturpflanzen sowie Nachbarkulturen dürfen mit dem Herbizid nicht in Kontakt kommen.** Anwendung unter Abschirmung erforderlich. Die Verwendung auf Dächern und Terrassen, auf Lagerplätzen, auf und an Strassen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen ist verboten.

### Notfallauskunft bei Vergiftungen:

Tox Info Suisse, Telefon 145 oder 044 251 66 66.

### Mode d'emploi avec pulvérisateur à dos:

Capito herbicide total concentré Forte contrôle les mauvaises herbes et les graminées.

Le produit est un **herbicide total de contact**. Appliquer au printemps sur des jeunes mauvaises herbes et graminées de moins de 10 cm de hauteur.

Les conditions idéales pour un traitement réussi sont les suivantes : temps chaud et ensoleillé, sur plantes sèches. Il ne devrait pas pleuvoir durant les 6 à 8 heures qui suivent le traitement. Repousses possibles de mauvaises herbes et graminées après un certain temps. Le cas échéant, répéter l'application après 5 à 10 jours.

**Champs d'application:** sous les arbres fruitiers, à noyaux ou à pépins, arbres et arbustes (hors forêts), cultures de fleurs, plantes vertes et rosiers, jachères avant un nouveau semis/plantation de nouvelles plantes ornementales ou de cultures maraîchères.

### Dosage: Contre les mauvaises herbes et graminées

avec le pulvérisateur à dos: dosage: 20 ml de produit dans 3 dl d'eau (6%) pour 10 m<sup>2</sup> de surface traitée. La surface du pack est de 125 m<sup>2</sup>. Les parties végétales ligneuses ne sont pas endommagées.

**Restrictions:** 2 traitements au maximum par année. Utiliser une cuve avec appareil de brassage en marche. Si la cuve n'en dispose pas, agiter ou remuer régulièrement la bouillie. Lors de l'application du produit, porter des lunettes de protection. Application sur les adventices sèches.

**Attention: Les parties vertes ou non ligneuses des plantes cultivées et les parcelles avoisinantes ne doivent pas entrer en contact avec l'herbicide.** Nécessité de prévoir un dispositif de protection.

Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d'entreposage, sur les routes, les chemins et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées.

### En cas d'urgence, intoxications:

Tox Info Suisse, tél. 145 ou 044 251 66 66.

### Modo d'impiego con pompa dei trattamenti a spalla (brentino):

Capito erbicida totale concentrato Forte, controlla le malerbe e le graminacee. Il prodotto è un **erbicida totale di contatto**. Va applicato in primavera su malerbe giovani e graminacee di altezza inferiore ai 10 cm. Le condizioni ideali per una buona riuscita sono le seguenti: tempo caldo e solatio, su piante asciutte. Non dovrebbe piovere entro le 6-8 ore seguenti il diserbo. Ricacci possibili di malerbe e graminacee dopo un certo tempo. In caso di mancata riuscita ripetere il diserbo dopo 5–10 giorni.

**Campo di applicazione:** Sotto di frutta a graneli, frutta a nocciolo, alberi e arbusti, (non di bosco), colture fiorali, piante verdi e rosai, maggese prima della semina/impianto di nuove piante ornamentali o di ortaggi.

**Dosaggio: Contro le malerbe e graminacee,** tramite la pompa a spalla: Dosaggio: 20 ml prodotto/3dl di aqua per 10 m<sup>2</sup> superficie trattata. La superficie della confezione è di 125 m<sup>2</sup>. Le parti vegetali legnose non vengono danneggiate.

**Restrizioni:** 2 trattamenti annui consentiti. Impiegare con un serbatoio per la poltiglia con miscelatore in funzione. Per gli apparecchi di irrorazione senza miscelatore agitare/rimiscolare la poltiglia regolarmente. Durante l'applicazione del prodotto, indossare gli occhiali di protezione. Applicazione su malerbe asciutte.

**Attenzione:** Le parti verdi e non legnose delle piante coltivate e sulle parcelle vicine non devono entrare in contatto con l'erbicida.

Richiesta una schermatura. Utilizzo vietato sulle terrazze e sulle aree di deposito, sulle strade, sentieri e piazze, su scarpate e le strisce verdi lungo le strade e binari della ferrovia.

### In caso di emergenza, intossicazione:

Tox Info Suisse, tel. 145 oppure 044 251 66 66.

### Bewilligungsinhaber/ Titulaire de l'autorisation/ Titolare dell'autorizzazione:

Stähler Suisse SA, Henzmannstrasse 17A, 4800 Zofingen, Tel. 062 746 80 00

### Vertrieb/ Distributeur/ Distributore:

Landi Schweiz AG  
CH-3293 Dotzigen  
Tel. 032 352 01 11

10 04 39\_95-2206ym